

Aix, avril 2009

HEM

Dr JP Larbre

cas

- H, 50 ans, PR depuis 4 ans, 6/7 ACR
- MTX+prednisone
- + étanercept ... rémission / monothérapie

- Lésion cutanée scapulaire postérieure G
- Nodulaire, 3 cm diamètre, ulcérée
- Dg : infection? Pyoderma? T?

HISTOLOGIE

- MO : prolifération de cellules tumorales dans le derme
- Immunomarquages : CD 31, tumeur endothéliale
- Hémangioendothéliome épithélioïde malin

cas - HEM

- Bilan extension négatif
- Exérèse élargie
- Radiothérapie sur 2 mois
- Suivi sous prednisone+leflunomide

Hémangioendothéliome épithélioïde malin

- Tumeur cutanée vasculaire, type angiosarcome
- Pas de cas avec anti TNF et Immunosuppresseurs
- Grave, récurrences locales; métastases gg, pulmonaires, hépatiques
- Ttt : exérèse, radiothérapie.

Carcinomes cutanés et étanercept

Publications de cas de développement rapide de carcinomes épidermoïdes après instauration d'étanercept, surtout psoriasis

- Br J Dermatol 2007
- Dermatology 2008

Chakravarty EF, J Rheumatol 2005

- 15789 PR, vs 3638 OA
- Carcinomes cutanés (basocellulaires et épidermoïdes) sous MTX et anti TNF, en particulier PR homme âgé, et si antécédent carcinome cutané.

Wolfe F, Arthritis Rheum 2007

- PR, 3 ans d'anti TNF
- Sur-risque de carcinome cutané
- Sur-risque de mélanome

En savoir plus !

Effets indésirables dermatologiques des anti
TNf

Bessis D., La lettre du rhumatologue 2009

A retenir

- Prêter attention à toutes les lésions cutanées sous anti TNF
- Discuter les dossiers à facteurs de risques de carcinomes cutanés, avant anti TNF, avec dermatologues.