

Polyarthrite Rhumatoïde et Fibromyalgie : une association fréquente et fortuite compliquant la prise en charge du rhumatisme.

F. COURY, A. ROSSAT, A. TEBIB, MC. LETROUBLON, A. GAGNARD, B. FANTINO,

Les avancées thérapeutiques de ces dernières années ont transformé la prise en charge et le pronostic de la Polyarthrite Rhumatoïde (PR), avec l'apparition de traitements efficaces mais coûteux. Il est ainsi devenu indispensable de pouvoir estimer précisément, d'une part l'activité initiale de la maladie rhumatismale, et d'autre part l'efficacité du traitement en place. Les outils de suivi actuels (notamment le Disease Activity Score, DAS 28) donnent une place importante à des paramètres subjectifs, qui en cas de survenue d'une Fibromyalgie (FM) associée, pourraient fausser cette mesure de l'activité. Nous avons conduit une étude prospective en 2001, portant au final sur 182 patients, dans le but d'estimer la valeur des index d'activité proposés dans la décision thérapeutique. Notre travail met en évidence une limitation du DAS 28 dans l'estimation de l'activité de la PR dans la population féminine en cas d'association à une FM ; il montre aussi que cette association est en partie fortuite, et surtout non seulement qu'elle ne représente pas un marqueur de sévérité de la PR, mais au contraire aurait un rôle protecteur.